



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anfdf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.58/ 16. 07. 2021

I. Condițiile climatice cu temperaturi ridicate și umiditate relativă a aerului peste 90% în orele de dimineață, și picăturile de rouă persistă pe frunze peste 2-3 ore, sunt foarte favorabile infecțiilor de **mană și alte boli la legume** (mana ceapă, mana și septorioza la tomate, mana la vinete, antracnoză, bacterioză la fasole și castraveti).

Recomandăm să se aplice tratamente la aceste culturi în perioada imediat următoare folosindu-se unul din următoarele produse:

I TOMATE, VINETE:

AMISTAR (MIRADOR 250 SC)	tomate	mana, fainarea, alternarioza, patarea cafenie	0,75-1,0 L/ha	3 zile
	vinete	Alternarioza, mana, fainarea		
SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC)	tomate	alternarioza	0,5 L/ha	7 zile
ORTIVA TOP	tomate	putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza	1,0 l/ha	7 zile
	vinete	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza		
CHAMP 77 WG (COPPERMAX)	tomate	basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%)	10 zile
ALLSTAR 250 SC	tomate	mana, Alternaria spp.	0,75-1,0 L/ha	3 zile

II CASTRAVETI ȘI FASOLE:

ALCUPRAL 50 PU	castraveti	patarea pustulara	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile
		mana	1,5-2,0 kg/ha	3 zile
	fasole	pătarea bacteriană	2,5 kg/ha (0,25%)	3 zile
MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG)	castraveti	mana	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	14 zile
	fasole	antracnoza	0,15 % (0,9 kg/ha in 600 L apa)	14 zile
BOUILLIE BORDELAISE WDG	castraveti	psedoperonospora cubensis (mana cucurbitaceelor),	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile
	fasole	psedomonas lacrimans (patarea unghiulara)		
INFINITO 687,5 SC	castraveti	mana cucurbitaceelor	1,4 l/ha	3 zile

III ARDEI:

SIGNUM (SYREX STAR)	ardei	putregaiul cenușiu, fainarea	1,5 kg/ha	3 zile
ALLSTAR 250 SC		Alternaria capsici annui (Alternarioza)	0,75-1,0 L/ha	3 zile
ORTIVA TOP	ardei	putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea, alternarioza	1,0 l/ha	7 zile

Tratamentul se va aplica la o frecvență de peste 5- 10% plante atacate.

Tratamentele se vor aplica în orele de dimineață sau seară, când plantele sunt uscate și temperatura aerului sub 25 °C.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Nu se vor trata legumele pentru consum curent.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Citiți și utilizați produsele conform recomandărilor de pe ambalaj

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză al fiecărui produs de protecția plantelor.

Folositi pentru tratamente produse cu substante active diferite, prin alternare.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

ȘEF SERVICIU
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina